PLANTES EN POT A FEUILLAGE DECORATIF

Adiantum
raddianum (syn cuneatum)

NOM FRANCAIS: *Capillaire* FAMILLE: **Polypodiacées (Adiantacées)**

ETYMOLOGIE: *Le nom de genre vient du grec adiantos "sec" à cause de l'eau qui glisse sur les feuilles sans être absorbé par la plante.*

DESCRIPTION: *Fougère rhizomateuse aux fines frondes pennées avec des segments cunéiformes qui sont lobés et qui s'ouvrent en éventail.*

FEUILLES:

INFLORESCENCE:

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *minimale hivernale ~15 ° C.*

LUMIERE: *modérée et diffuse*

HYGROMETRIE: *très forte*

MELANGE TERREUX: *tourbeux avec un peu de terreau*

MULTIPLICATION: *division de rhizome*

ORIGINE: Amérique et Asie Tempéré et Tropicale (Brésil).

CARTE POLITIQUE:



VUE ECOLOGIQUE:



chj© C-H JEROME

chj©

Arachnoides adiantiformis (G. Forst.) Tind.
(*Rumohra adiantiformis* (G. Forst **...)**

chj©

Asparagus plumosus

NOM FRANCAIS: ***Asparagus plumeuse*** FAMILLE: **Liliacées**

ETYMOLOGIE: *vient du latin, de l'espèce comestible Asparagus officinalis bien connue de l'Antiquité Romaine.*

DESCRIPTION: *Plante rampante à l'état spontané, assez grande aux tiges grêles et ramifiées. Les racines étant rhizomateuses.*

FEUILLES: *réduites à des "bractées" écailleuses et les extrémités des ramifications qui sont très minces, presque en forme d'aiguilles donnant l'aspect de plumes.*

INFLORESCENCE: *petites fleurs blanches insignifiantes.*

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *5 - 10 ° C.*

LUMIERE: *bonne, pas de rayonnement direct : 800 lux minimum.*

HYGROMETRIE: *pas d'exigeance particulière.*

MELANGE TERREUX: *substra humifère et drainant.*

MULTIPLICATION: *division de touffe au printemps.*

ORIGINE: Afrique du Sud

CARTE POLITIQUE:

VUE ECOLOGIQUE:



chj©
C-H JEROME

Asperge *Protasparagus (Asparagus) densiflorus 'Plumosus'* ASPARAGACEES

Asperge *Protasparagus (Asparagus) densiflorus 'Falcatus'* ASPARAGACEES

chj©
C.H JEROME

Asperge *Protasparagus (Asparagus) densiflorus* 'Sprengerii' ASPARAGACEES

chj©

chj©

Fougère nid d'oiseau *Asplenium nidus-avis*
ASPLENIACEES

chj©

Begonia
"Rex X Cultorum"

NOM FRANCAIS: *Begonia* FAMILLE: **Begoniacées**

ETYMOLOGIE: *Genre donné par Linné en l'honneur de Michel Bégon (1638-1710), gouverneur de St Domingue et grand mécène pour les botanistes.*

DESCRIPTION: *Genre qui comprend plus de 1000 espèces avec un nombre de cultivars incalculable.Ce sont des plantes monoïques : les pieds mâles sont généralement caduques en opposition aux pieds femelles.*

FEUILLES: *dissymétriques, acuminées, plus ou moins dentées. Les couleurs varient avec une dominante de rose, rouge, vert qui entoure un limbe argenté. Système racinaire rhizomateux.*

INFLORESCENCE: *FRUITS : Capsules de section triangulaire, ailées.*

PARTICULARITES: *leur classification se fait par rapport à leur système racinaire : 1- les espèces bulbeuses (bulbe tubercule) 2- les espèces tubéreuses voir semi-tubéreuses (hybride) 3- les espèces rhizomateuses 4- les espèces à racines fibreuses*

TEMPERATURE: *13 ° C.*

LUMIERE: *pas d'ensoleillement direct mais une lumière diffuse.*

HYGROMETRIE: *très importante mais pas stagnante à cause des maladies cryptogamiques.*

MELANGE TERREUX: *riche et poreux*

MULTIPLICATION: *semis, bouturage de rhizomes et de feuilles.*

ORIGINE: Mexique, Indonésie, Zones tropicales

CARTE POLITIQUE:

VUE ECOLOGIQUE:



chj©
C-H JEROME

Begonia rex BEGONIACEES

chj©

Chamaedora *Chamaedora elegans*
ARECACEES

chj©

Chrysalidocarpus lutescens ARECACEES

Palmier éventail *Chamaerops humilis*
ARECACEES

chj©

Chlorophytum *Chlorophytum elatum 'Variegatum'*
ANTHERICACEES

Chlorophytum *capense 'Variegatum'*

chj©

Cissus antarctica

NOM FRANCAIS: *Cissus* FAMILLE: **Vitacées**

ETYMOLOGIE: *vient du grec kissos "vigne". La majorité des espèces étant grimpante.*

DESCRIPTION: *200 espèces composent ce genre. Certaines sont herbacées et d'autres bien que rampantes sont succulentes et xerophytes.*

FEUILLES: *Elles sont simples (antarctica) ou composées de trois folioles (rhombifolia) à l'aisselle desquelles apparaissent des vrilles volubiles qui permettent à la plante de s'accrocher.*

INFLORESCENCE: *Elles apparaissent à l'aisselle des feuilles pour donner des fruits de type baies.*

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *10 à 15 ° C.*

LUMIERE: *bonne mais diffuse pour les espèces "lianes", soleil direct pour les xerophytes : 600 lux minimum.*

HYGROMETRIE: *importante sauf en période de repos végétatif.*

MELANGE TERREUX: *humifère et perméable.*

MULTIPLICATION: *bouturage herbacée ou demi-ligneux.*

ORIGINE: Zones Tropicales et Subtropicales (Amérique Centrale / Sud)

CARTE POLITIQUE:

VUE ECOLOGIQUE:



chj© C-H JEROME

Cissus antarctica
VITACEES

chj©

Croton *Codiaeum variegatum* EUPHORBIACEES

chj©

Cordyline terminalis

NOM FRANCAIS: *Cordyline* FAMILLE: **Liliacées**

ETYMOLOGIE: *vient du grec kordyle "massue" à cause de la forme des racines de certaines espèces.*

DESCRIPTION: *Plantes sempervirente, arbustive à racines blanches développant un "turion" qui la différencie d'un genre voisin : Dracoena.*

FEUILLES: *Les feuilles de l'espèce type sont oblongues, lancéolées, vert bronze nuancé de rose ou de rouge à l'état juvénile.*

INFLORESCENCE:

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *16 ° C.*

LUMIERE: *très abondante sans soleil direct : 1000 lux minimum.*

HYGROMETRIE:

MELANGE TERREUX: *sphaigne broyée + terreau pour maintenir les racines humides et fraiches.*

MULTIPLICATION: *bouturage de la partie apicale ou par tronçon de tige sans feuille.*

ORIGINE: Indes et Iles du Pacifique, Nouvelles Zélande

CARTE POLITIQUE:



VUE ECOLOGIQUE:



chj© C-H JEROME

Cordyline terminalis ou fruticosa
AGAVACEES

Cnj©

Dieffenbachia picta

NOM FRANCAIS: *Dieffenbachia* FAMILLE: **Aracées**

ETYMOLOGIE: *Le nom fut donné à ce genre en l'honneur de J. F. Dieffenbach (1790 - 1863) à qui étaient confiés les jardins du palais Impérial de Vienne.*

DESCRIPTION: *Plante herbacée vivace d'environ 2 m de haut, souvent en touffes au stype érigé et charnu qui devient tordu ou incliné à la base et qui se dégarni à la base lorsque la plante vieillit.*

FEUILLES: *oblongues ou lancéolées, acuminées au sommet, souvent panachées, maculées de blanc le long des nervures secondaires chez amoena, vert vif et maculé irrégulièrement de blanc au bord de la grosse nervure médiane chez picta.*

INFLORESCENCE: *Typique de la famille avec un spadice et une spathe convolutée blanchâtre à verdâtre.*

PARTICULARITES: *La plante contient des sucs toxiques qui ne doivent pas être mis en contact avec les muqueuses (surtout les yeux et la bouche).*

TEMPERATURE: *15 à 18 ° C. selon les espèces.*

LUMIERE: *importante pour fixer les panachures mais supporte la lumière moyenne : 800 lux minimum.*

HYGROMETRIE: *importante en été.*

MELANGE TERREUX: *très perméable et poreux (éviter la pourriture des racines).*

MULTIPLICATION: *bouturage apicale + tronçons de tiges sans feuilles.*

ORIGINE: Amérique Tropicale, Brésil

CARTE POLITIQUE:

VUE ECOLOGIQUE:



chj©
C H JEROME

Dieffenbachia amoena
ARACEES

lawnpatiobarn.wordpress.com

chj©

Dieffenbachia picta

Dizygotheca elegantissima

NOM FRANCAIS: *Aralia* **FAMILLE:** **Araliacées**

ETYMOLOGIE: *vient du grec dis "deux fois", zygos "poire" et theke "case" car les anthères des fleurs sont quadriloculaires.*

DESCRIPTION: *plante arborescente de plus de 7 m. de hauteur à l'état spontané.*

FEUILLES: *composées, digitées, aux folioles étroites et dentées. A l'état juvénile de couleur rouge brun et par la suite elles deviennent vert foncé avec des nervures ressortant sur chaque pétiole.*

INFLORESCENCE: *inexistante en plante cultivée, insignifiante à l'état spontané.*

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *~ 15 ° C.*

LUMIERE:

HYGROMETRIE: *la plus élevée afin de retarder la lignification et la chute des feuilles à la base.*

MELANGE TERREUX: *terreau de feuilles + tourbe + drainant*

MULTIPLICATION: *bouturage d'extrémités herbacée.*

ORIGINE: Iles Vanuatu (Archipel des Nouvelles-Hébrides).

CARTE POLITIQUE:



VUE ECOLOGIQUE:



chj©
C-H JEROME

Aralia elegantissima syn:
Dizygotheca ou schefflera elegantissima
ARALIACEES

chj©

Dracaena deremensis

NOM FRANCAIS: *Dracaena* FAMILLE: **Liliacées**

ETYMOLOGIE: *du grec drakaina "femelle du dragon" à cause de sa lymphe résineuse et rougeâtre qui donne des colorants comme le "sang du dragon". On la retrouve dans l'espèce draco des îles Canaries.*

DESCRIPTION: *Genre qui comprend plus de 40 espèces, plantes toujours vertes, arbustives ou arborescentes.*

FEUILLES: *ensiformes, linéaires ou lancéolées, disposées en rosette à l'extrémité des tiges. Elles peuvent être sessiles ou comporter un pétiole avec une base ou un pétiole engainant. Marges vertes striées de deux bandes blanches.*

INFLORESCENCE:

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *10 à 16 ° C. suivant les espèces.*

LUMIERE: *bonne surtout pour les espèces à fortes panachures : 500 à 800 lux suivant les espèces.*

HYGROMETRIE: *élevé pour les espèces délicates mais supporte une hygrométrie moyenne cependant.*

MELANGE TERREUX: *terreau poreux + tourbe*

MULTIPLICATION: *bouturage ou marcottage suivant la lignification de la tige.*

ORIGINE: Zones Tropicales et Subtropicales (notamment l'Afrique : Guinée, Niger)

CARTE POLITIQUE:

VUE ECOLOGIQUE:



chj© CH JEROME

Dracaena deremensis
'Bausei'
DRACAENACEES
chj© C.H JEROME

chj©

Dracaena fragrans
DRACAENACEES

Dracaena sanderiana
DRACAENACEES

chj©

Epipremnum (Scindapsus) pinnatatum aureum (aureus)

NOM FRANCAIS: *Pothos* FAMILLE: **Aracées**

ETYMOLOGIE: *vient du grec skindapsos, qui désignait une plante (non identifiée) au port semblable à celui du lierre.*

DESCRIPTION:

FEUILLES: *entières, cordées et obliques qui deviennent à l'état adulte lobées et lacinées et qui atteignent plus de 50 cm de long. le limbe est panaché de jaune, la tige présente des racines adventives aux noeuds.*

INFLORESCENCE:

PARTICULARITES: *Quelques cultivars sont appréciés dont "Marble Queen" aux feuilles presque entièrement blanches mouchetées de vert.*

TEMPERATURE: *13 - 16 ° C.*

LUMIERE: *bonne lumière diffuse surtout pour les cultivars panachés.*

HYGROMETRIE:

MELANGE TERREUX: *grossier et très poreux.*

MULTIPLICATION: *bouturage classique herbacée.*

ORIGINE: Iles Salomon

CARTE POLITIQUE:



VUE ECOLOGIQUE:



chj©
CH JEROME

Epipremnum pinnatum ‘Aureum’ syn: Scidapsus aureus ARACEES

Epipremnum pictum **‘Argyreus’ syn: Scidapsus pictus ARACEES**

chj©

Aralia (Fatsia)
sieboldii (japonica)

NOM FRANCAIS: ***Aralia (Fatsia)*** FAMILLE: **Araliacées**

ETYMOLOGIE: *Origine Japonaise*

DESCRIPTION: *arbuste persistant aux tiges ramifiées capable de résister aux hivers si il est suffisamment abrité. Il est capable de "taller".*

FEUILLES: *palmées, lobées, d'un vert brillant d'environ 20 cm de diamètre.*

INFLORESCENCE: *insignifiante, composées de petites fleurs blanchâtres aux extrémités des tiges qui donneront des baies (fruits) d'abord vertes puis noires.*

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *résiste à des gelées brèves et occasionnelles.*

LUMIERE: *bonne mais diffuse, 800 lux minimum.*

HYGROMETRIE: *aucune importance, mais bien nettoyer les feuilles.*

MELANGE TERREUX: *plante peu exigeante mais aime bien les terres fertiles.*

MULTIPLICATION: *marcottage et bouturage d'extrémités.*

ORIGINE: *Japon*

CARTE POLITIQUE:



VUE ECOLOGIQUE:



chj©
C H JEROME

Fatsia japonica syn:
*Aralia sieb*oldii ARALIACEES

X Fatshedera lizei:
*Aralia sieb*oldii X Hedera helix
ARALIACEES

chj©

Ficus benjamina

NOM FRANCAIS: *Ficus* FAMILLE: **Moracées**

ETYMOLOGIE: *nom latin utilisé pour ficus carica, plante qui produit les figues comestibles. Originaire du Moyen-Orient, elle s'est peut être acclimatée.*

DESCRIPTION: *C'est l'un des genres les plus polymorphes de tout le règne végétal. Il comprend ~800 à 1000 espèces : arborescentes, arbustives, semi-herbacées, parfois rampantes, semi-epiphytes puis "étrangleurs" grâce à leurs racines adventives.*

FEUILLES: *arborescent dans la nature, port retombant avec des feuilles vert foncé, ovées, assez droite et longues, acuminées à l'apex.*

INFLORESCENCE: *enfermée dans des réceptacles ronds,percés à l'extrémité ("sycone"). FLEURS : uniséxuées,disposées près de l'orifice (fleurs mâles) et sur le fond des parois (fleurs femelles). Donneront naissance au fruit comestible chez ficus carica.*

PARTICULARITES: *Le banian du jardin botanique de Calcutta (ficus benghalensis) recouvre une surface de 14 000 m2. Son énorme couronne est supportée par 1400 racines adventives et son âge est estimé à ~200 ans.*

TEMPERATURE: *10 à 13 ° C. sauf pour le ficus elastica qui peut supporter des températures avoisinant les 0 ° C.*

LUMIERE: *diffuse dans l'ensemble, plus importante pour les cultivars panachés : 400 à 800 lux minimum selon les espèces.*

HYGROMETRIE: *importante dans l'ensemble ou l'on risque une chute du feuillage.*

MELANGE TERREUX:

MULTIPLICATION: *bouturage ou marcottage suivant le degré de lignification de la plante.*

ORIGINE: Zones Tropicales et Subtropicales: Inde, Malaisie, Indonésie, Afrique, Chine.
Des restes fossilisés ont été trouvés au Groenland.

CARTE POLITIQUE:



VUE ECOLOGIQUE:



chj©
C-H JEROME

Ficus elastica ‘Decora’ MORACEES

Ficus deltoidea MORACEES

Ficus lyrata ou pandurata
MORACEES

Ficus benjamina **MORACEES**

Ficus pumila ou repens **MORACEES**

C-H JEROME

chj©

Howeia forsteriana

NOM FRANCAIS: *Howeia (Kentia)* FAMILLE: **Arécacées (Palmacées)**

ETYMOLOGIE: *Vient de son lieu d'origine : l'île de Lord Howe. En horticulture elle est appelée "kentia".*

DESCRIPTION: *Arborescente dans la nature, elle peut atteindre 18 m de haut. très résistant mais pousse très lentement (2 à 3 feuilles par an). Le stipe (court en culture) est fort et rigide. Il porte un bouquet de grandes feuilles pennées.*

FEUILLES: *pennées aux folioles acuminées sur de longs pétioles vert sombre d'abord érigés puis infléchis légèrement.*

INFLORESCENCE: *Plante monoïque avec des inflorescences en "épis".*

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *peu exigeante en amplitude thermique, elle se contente même de température ~10 ° C.*

LUMIERE: *peu exigeante, pas de soleil direct : 800 lux minimum.*

HYGROMETRIE: *aucune exigence particulière.*

MELANGE TERREUX: *humifère et bien drainé.*

MULTIPLICATION: *semis (très long en général d'importation).*

ORIGINE: Iles de Lord Howe (Pacifique du Sud)

CARTE POLITIQUE:



VUE ECOLOGIQUE:



chj©
C-H JEROME

Howea forsteriana Becc. Syn: *Kentia forsteriana*
ARECACEES

chj©
entre-bretagne-et-roussillon.com

Hypoestes
sanguinolenta (sanguinea)

NOM FRANCAIS: *Hypoestes* FAMILLE: **Acanthacées**

ETYMOLOGIE: *du grec hypo "sous" et estia "maison" Allusion faite par rapport au calice qui par les bractées.*

DESCRIPTION: *Plante herbacée. ramifiée.*

FEUILLES: *Petites feuilles ovales acuminées, vertes la face supérieure irrégulièrement recouvertes de petites tâches (espèce type) blanches rouges suivant les cultivars.*

INFLORESCENCE: *en "épis" fleurs lilas les bractées vertes, intérêt décoratif, mieux les supprimer pour la vitalité de la plante.*

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *13 à 16 ° C.*

LUMIERE: *très importante sans ensoleillement direct.*

HYGROMETRIE: *importante pour éviter la chute des feuilles.*

MELANGE TERREUX: *humifère essentiellement.*

MULTIPLICATION: *Semis et bouturage herbacée classique.*

ORIGINE: Madagascar

CARTE POLITIQUE:

VUE ECOLOGIQUE:



chi© CH JEROME

Hypoestes phyllostachya Syn: *Hypoestes sanguinolenta*
ACANTHACEES

chj©

Maranta
leuconeura

NOM FRANCAIS: *Maranta*

FAMILLE: **Marantacées**

ETYMOLOGIE: *Ce nom fut donné en l'honneur de Bartolomeo Maranta, médecin et botaniste du 16ème Siècle.*

DESCRIPTION: *Plantes herbacées, vivaces aux souches rhizomateuses d'où apparaissent des touffes de feuilles. Les noeuds sont importants et peuvent permettent un enracinement facile pour le bouturage.*

FEUILLES: *Elles portent de magnifiques panachures suivant les cultivars qui varient du vert clair au vert sombre avec des lignes rouges qui suivent les nervures secondaires (erythoneura tricolor), le tout avec un dessin argenté.*

INFLORESCENCE: *FEUILLES (SUITE) : Elles sont elliptiques et obtuses à l'extrémité avec des pétioles assez longs et engainants et ailés, d'où les nouvelles feuilles apparaissant successivement convolutées puis déroulant leur limbe une fois sortie.*

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *~ 16 ° C.*

LUMIERE: *bonne mais diffuse.*

HYGROMETRIE: *maximale mais sans pulvérisation pour ne pas tâcher les feuilles.*

MELANGE TERREUX: *léger, poreux et grossier avec un drainage excellent.*

MULTIPLICATION: *division de "racines" (repos végétatif) ou bouturage herbacée: couper tige sous noeud comportant touffe feuilles.*

ORIGINE: Brésil

CARTE POLITIQUE:

VUE ECOLOGIQUE:



chj©
CH JEROME

Maranta leuconeura 'Erythroneura'

Maranta leuconeura **‘ Kerchoviana’** ***MARANTACEES***

chj©

Monstera deliciosa

NOM FRANCAIS: *Monstera* FAMILLE: **Aracées**

ETYMOLOGIE: *On suppose qu'il peut provenir du latin monstrum par allusion à la grandeur et à l'aspect étrange des feuilles de certaines espèces.*

DESCRIPTION: *Ce genre comprend environ 30 espèces, toutes rampantes, avec des racines aériennes adventives qui s'accrochent sur les arbres ou sur les roches humides.*

FEUILLES: *Feuill. + en + petites voir presque difformes si tuteurs et humidité nécessaire manquent. Espèce deliciosa : plante rampante, tiges lianifiées aux proportions remarquables. Feuilles très grandes, coriaces, profondt découpées et ajourées le long des nervures.*

INFLORESCENCE: *FEUILLES (SUITE) : ... et peuvent atteindre 1 m de longueur avec une largeur proportionnée.*

FLEURS : Elles sont très serrées sur spadice pétiolé, elles sont hermaphrodite.

PARTICULARITES: *Le dimorphisme feuilles jeunes / adultes est si accentué qu'une version consiste à classer cette plante dans un autre genre et une autre espèce à l'état jeune : le Philodendron pertusum. Distinction toujours controversé actuellement.*

TEMPERATURE: *13 ° C. minimum.*

LUMIERE: *excellente pour garder les feuilles bien découpées et bien développées : 300 lux minimum.*

HYGROMETRIE: *très élevée avec bassinage foliaire + tuteurs de mousses les plus humides possibles.*

MELANGE TERREUX: *très poreux et grossier : terreau + tourbe + perlite. Système radiculaire peu étendu : gros contenants inutiles.*

MULTIPLICATION: *bouturage d'extrémité ou tronçons de tige.*

ORIGINE: Amérique Centrale / Mexique

CARTE POLITIQUE:

VUE ECOLOGIQUE:



chj©
C H JEROME

Monstera deliciosa ARACEES(Plante + inflorescences +fruits)

chj©

Nephrolepis exaltata

NOM FRANCAIS: *Nephrolepis* FAMILLE: **Polypodiacées**

ETYMOLOGIE: *vient du grec nephros "rein" et lepis "ecaillé" par allusion à la forme de l'indusie (mince membrane qui sert d'abri aux spores).*

DESCRIPTION: *Fougère epiphyte dont l'espèce type aux frondes pennées, élancées ne se cultive pratiquement pas, mais on la remplace par un grand nombre de cultivars d'aspects variés quant à la longueur des feuilles,au port,aux pinnules qui peuvent être*

FEUILLES: *SUITE : ... bipennées voir tripennées, plus ou moins frisées. Ex. : "Teddy junior" aux pinnules ondulées et plissées, "Rooseveltii-Plumosu" aux feuilles bipennées et aux pinnules frisées et profondément découpées ...*

INFLORESCENCE: *SUITE : ... "Bostoniensis" aux larges feuilles tombantes vert foncé et aux pinnules ondulées ...*

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *~ 18 ° C.*

LUMIERE: *ombre de préférence assez clairsemée, pas de soleil direct.*

HYGROMETRIE: *importante et constante.*

MELANGE TERREUX: *humifère, riche de substances nutritives. Ex. : Terreau + Tourbe.*

MULTIPLICATION: *Semis de spores, division de touffe (éventuellement stolonnage).*

ORIGINE: Amérique Tropicale et Centrale, Zones Tropicales et Subtropicales.

CARTE POLITIQUE:



VUE ECOLOGIQUE:



chj©
C-H JEROME

***Nephrolepis exaltata* OLEANDRACEES OU NEPHROLEPIDACEES**

chj©

Philodendron scandens

NOM FRANCAIS: *Philodendron* FAMILLE: **Aracées**

ETYMOLOGIE: *le nom est formé des mots grecs philos "aime" et dendron évoquant le port rampant de la plupart des espèces qui dans leur milieu naturel (forêts tropicales) poussent en enlaçant les arbres avec leurs racines aériennes.*

DESCRIPTION: *plante très résistante avec une température de ~7 ° C. et supportant des températures très élevées.*

FEUILLES: *cordiformes et acuminées de couleur vert bronze. On note une présence de stipules rosées et de racines adventives qui sont situées aux entre-noeuds. C'est l'espèce chez le genre philodendron qui demande le moins de soins possible.*

INFLORESCENCE:

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *de 13 à 16 ° C. pour la plupart des espèces.*

LUMIERE: *originaire de sous bois, ce n'est pas un genre très exigeant : 300 lux minimum.*

HYGROMETRIE: *varie selon espèces mais toutes en ont besoin pour maintenir turgescence des tissus et alimenter les racines aériennes.*

MELANGE TERREUX: *très perméable et poreux.*

MULTIPLICATION: *bouturage de tronçons de tiges ou d'extrémité.*

ORIGINE: Antilles, Porto-Rico, Amérique tropicale et subtropicale.

CARTE POLITIQUE:



VUE ECOLOGIQUE:



chj©
C H JEROME

Philodendron X hybrida «'Red Princess Aroid' ARACEES

Philodendron scandens et pertusum ARACEES

chj©

Pilea
cadierei

NOM FRANCAIS: *Pilea* FAMILLE: **Urticacées**

ETYMOLOGIE: *vient du latin "pileus",coiffe en feutre portée par les romains, terme issu du grec pilos qui désignait n'importe quel objet en feutre. Le nom s'explique par le fait que chez les fleurs femelles les segments du perianthe recouvrent l'akène.*

DESCRIPTION: *plante vivace toujours verte*

FEUILLES: *opposées, pétiolées, abovées et acuminées, avec leurs marges crenelées. Le limbe, en relief entre les nervures deprimées est panaché d'argent sur fond vert, plus sombre dans les vieilles feuilles.*

INFLORESCENCE:

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *10 à 16 ° C.*

LUMIERE: *peu exigeante : 2000 lux minimum*

HYGROMETRIE: *importante dans l'ensemble.*

MELANGE TERREUX: *le terreau doit être poreux et humifère.*

MULTIPLICATION: *boutures d'extrémités classiques.*

ORIGINE: Indochine

CARTE POLITIQUE:

VUE ECOLOGIQUE:

chj© C-H JEROME

Pilea cadieri et spruceana URTICACEES

chj©

Platycerium bifurcatum

NOM FRANCAIS: *corne de cerf ou d'élan* FAMILLE: **Polypodiacées**

ETYMOLOGIE: *vient du grec platys "grand" et keras "corne" à cause de la forme des frondes.*

DESCRIPTION: *fougère epiphyte dont les feuilles peuvent atteindre 5 m de long. Ces feuilles peuvent être de deux types stériles ou fertiles. Les feuilles stériles sont vertes puis brunes, concoïdes, se dressent à la verticale en se chevauchant. Lorsqu'elle ...*

FEUILLES: *SUITE : ... se fanent, elles s'imbriquent de façon à protéger l'humus formé par les matériaux qui pourrissent au dessous. Les feuilles fertiles, verticales ou tombantes, fourchues portent sur leur envers des sporanges bruns, poudrés et fermés.*

INFLORESCENCE:

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *~10 ° C.*

LUMIERE: *diffuse même peu importante : 800 lux minimum.*

HYGROMETRIE: *très importante à élever par tous les moyens.*

MELANGE TERREUX: *pour plante epiphyte*

MULTIPLICATION: *par semis de spores ou en prélevant de nouveaux bourgeons à la base que l'on met en culture.*

ORIGINE: Australie, Amérique du Sud, Afrique, Asie.

CARTE POLITIQUE:



VUE ECOLOGIQUE:



chj©
C-H JEROME

PLATYCERIUM BIFURCATUM

Platycerium grande POLYPODIACEES



chj©

Pteris cretica

NOM FRANCAIS: *Pteris*

FAMILLE: **Polypodiacées (Ptéridacées)**

ETYMOLOGIE: *vient du grec pteron "aile" allusion aux frondes légères et élégantes.*

DESCRIPTION: *genre qui regroupe une soixantaine d'espèces très variées qui regroupent elles-mêmes de nombreux cultivars.*

FEUILLES: *DESCRIPTION (SUITE) : Il a des tiges longues et verticales, jaunes ou brun clair de 10 à 30 cm de long, des pennes simples, coriaces, de couleur vert tendre, d'une longueur de 20 à 30 cm et d'une largeur de 15 à 20 cm, aux pinnules lancéolée*

INFLORESCENCE: *SUITE : ...ligulées, très finement incisées ou découpées. Le cultivar "Albolineata" a des pennes larges et des pinnules linéaires à bandes centrales blanches.*

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *13 à 16 ° C.*

LUMIERE: *diffuse mais pas trop réduite.*

HYGROMETRIE: *très importante.*

MELANGE TERREUX: *terreau qui doit rester humide sans excès d'eau.*

MULTIPLICATION: *division de rhizomes au printemps.*

ORIGINE: Inde et Australie

CARTE POLITIQUE:



VUE ECOLOGIQUE:



chj© CH JEROME

Pteris cretica
PTERIDACEES

Pteris ensiformis
PTERIDACEES

chj©

Radermachera sinica BIGNONIACEES

chj©

Sansevieria trifasciata "Laurentii"

NOM FRANCAIS: *Sansevière* FAMILLE: **Agavacées (Liliacées)**

ETYMOLOGIE: *baptisé par erreur par le naturaliste Suédois Thumberg en l'honneur de P. A. Sanseverino créateur d'un jardin de plantes rares en Italie du Sud : confusion avec raimondo, Prince de Sansevero, militaire et inventeur.*

DESCRIPTION: *ce genre comprend 60 espèces, toutes herbacées, coriaces à rhizomes et feuilles caulescentes.*

FEUILLES: *érigées, coriaces, linéaires, légèrement concaves, vert foncé marginées de jaune, striées transversalement et irrégulièrement de vert-gris ou de blanc cassé.*

INFLORESCENCE: *sans grand intérêt, esthétique, sont constituées de petites fleurs blanc verdâtre et exhalent un parfum la nuit.*

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *10 - 13 ° C. Voir moins en condition de sécheresse.*

LUMIERE: *peu importante : 300 lux minimum, mais se porte mieux avec plus de lumière.*

HYGROMETRIE: *pas d'exigence particulière.*

MELANGE TERREUX: *plus consistant que les autres plantes tropicales, plante exigeante.*

MULTIPLICATION: *division de touffe (rhizome), bouturage de feuille valable uniquement chez l'espèce type.*

ORIGINE: Zaïre et Tanzanie.

CARTE POLITIQUE:



VUE ECOLOGIQUE:



chj©
CH JEROME

Sansevieria trifasciata 'Laurentii'
AGAVACEES

chj©

Syngonium podophyllum

NOM FRANCAIS: *Syngonium* FAMILLE: **Aracées**

ETYMOLOGIE: *vient du grec syn "réuni" et gone "sein", il fait allusion aux étamines qui sont soudées avec l'ovaire.*

DESCRIPTION: *espèce la plus cultivée parmi la vingtaine existante.*
Les tiges sont toutes flexibles, rampantes grâce à des racines adventives.

FEUILLES: *sagittées à l'état juvénile, deviennent palmées à l'état adulte. Elles peuvent se diviser en neuf segments. Elles peuvent être plus décoratives chez certains cultivars. Ex. nervures blanches chez les jeunes feuilles du cultivar "Albo-lineatum".*

INFLORESCENCE: *Elles sont typique de la famille : un spadice plus court que la spathe qui l'entoure mais n'apparaissent presque jamais en culture, même sur plante adulte en serre.*

PARTICULARITES:

TEMPERATURE: *~13 - 16 ° C.*

LUMIERE: *bonne mais diffuse : 300 lux minimum pour l'espèce type, plus pour les cultivars panachés.*

HYGROMETRIE: *supporte l'air relativement sec mais peut vivre immergé dans l'eau.*

MELANGE TERREUX: *terreau poreux + tourbe + drainant comme toutes les plantes de la même famille.*

MULTIPLICATION: *boutures herbacées d'extrémité ou boutures de tronçons de tiges.*

ORIGINE: Amérique Centrale, Mexique

CARTE POLITIQUE:

VUE ECOLOGIQUE:



chj©
CH JEROME

Syngonium podophyllum ARACEES

chj©

Yucca elephantipes AGAVACEES

chj©